

Бродлайн Спот-Он

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бродлайн Спот-Он – новейший препарат, разработанный специально для кошек
- Эффективная защита от 20 видов внутренних и внешних паразитов
- Наружное применение – легко для Вас, минимум стресса для Вашей кошки
- Сохранение эффективности даже при мытье с шампунем*
- Для котят с 7 недель и взрослых кошек
- Инновационный аппликатор – аккуратность применения и точность дозирования
- Разработка Meril (Франция) – гарантия качества



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



- Разрезать блистер ножницами по линии отреза. Извлечь аппликатор из упаковки.
- При вертикальном положении аппликатора оттянуть паровую вилку.
- Наконечник повернуть и снять.
- Раздвинуть шерсть по средней линии шеи между основанием черепа и лопатками и вводить все содержимое аппликатора непосредственно на кожу в одно место.

Бродлайн Спот-Он относится к комбинированным противопаразитарным лекарственным препаратам. Входящие в состав препарата фипронил, (о)-метопрол, эприниксимицил и пропоксифен обеспечивают его широкий спектр действия в отношении экто- и эндопаразитов кошек: блох *Ctenocephalides felis* (профилактика и профилактические фазы развития блох); власоедов *Felicola subrostratus*; иксодовых клещей *Dermacentor variabilis*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes trianguliceps*, *Ixodes vespertilionis*, *Ixodes ricinus*, *Haemaphysalis longicornis*, *Haemaphysalis flava*, *Haemaphysalis concinna*; желудочно-кишечных нематод *Toxascaris cati* (личички L3, L4, неполовозрелые и взрослые формы), *Ancylostoma tubaeforme* (личички L4 и взрослые формы), *Toxascaris leonina* и *Ancylostoma braziliense* (половозрелые формы); нематоды тонкого кишечника *Capillaria plicata*, желчных протоков *Aelurostrongylus abstrusus*, *Capillaria spp.*; личинок дифимарий *Dirofilaria immitis*; цестод *Dipylidium caninum*, *Taenia taeniarum*, *Echinococcus multilocularis* (все фазы развития).

Перед применением препарата Бродлайн Спот-Он внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

*Buzdalov et al. 1997; Bugniet et al. 2000; Meisnon et al. 2010; Bauland and Schepel, 2011; Corral et al. 2013
*Tesi et al. 2008; Bondi et al. 2007; Pavesi et al. 2008; Bugniet et al. 2010
*данные в месяц.

Бродлайн Спот-Он

Эффективная защита от 20 внутренних и внешних паразитов



Для тех, кто любит кошек



СПРАШИВАЙТЕ В СЕТИ
КЛИНИК ANIMALIYA

ВНУТРЕННИЕ ПАРАЗИТЫ

До 30% кошек поражены гельминтами!



Более 10 видов гельминтов паразитируют в организме кошки

4 ИЗ НИХ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЩИМИ ДЛЯ КОШКИ И ЧЕЛОВЕКА



Риск заражения гельминтами возрастает, если:

- отсутствует регулярная профилактика гельминтозов
- кошка питается сырой рыбой и мясом
- кошке позволяет контакт с пищей человека
- у владельца нет привычки мыть руки после общения с кошкой
- хозяин не использует перчатки при чистке кошачьего лотка

СИМПТОМЫ

Внутренние паразиты

- Истощение
- Тусклая шерсть
- Расстройство пищеварения
- Рвота

Внешние паразиты

- Тусклая шерсть
- Росчесы
- Беспокойство
- Анемия

Симптомы могут не проявляться длительное время



Особенно важно, если:

- Кошка активно гуляет и охотится на улице
- Возраст кошки до 6 месяцев
- Кошка живет в семье, где есть маленькие дети
- В доме содержится более одного животного

Применять Бродлайн Спот-Он ЕЖЕМЕСЯЧНО

ВНЕШНИЕ ПАРАЗИТЫ

До 70% кошек заражены блохами!



Блохи – одна из основных причин аллергического дерматита

Блохи являются переносчиками

- инфекционных заболеваний:
 - риккетсиоза
 - микоплазмоза
 - фебриноза или «болезни кошачьих царапин» (острого инфекционного заболевания человека, вызываемого бактерией Bartonellay)



Иксодовые клещи доставляют беспокойство кошкам укусами и являются переносчиками болезни Лайма (боррелиоза) – также общей для человека и кошки



Домашние кошки **ПОДВЕРЖЕНЫ РИСКУ ЗАРАЖЕНИЯ** гельминтами и блохами.

Яйца блох и гельминтов можно занести в дом на обуви или одежде.

СИМПТОМЫ ЗАРАЖЕНИЯ КОШКИ ПАРАЗИТАМИ МОГУТ БЫТЬ НЕЗАМЕТНЫ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.

ЭТО ВАЖНО!